NOTICE

APETIL PLUS®

Pantéthine / Carnitine / Cyproheptadine

COMPOSITION

Pantéthine ……...500 mg
Carnitine (Chlorure de)…….1500 mg
Cyproheptadine (Chlorhydrate de)……...……..22,5 mg
Excipients……..……...q.s.p 100 ml
Excipient à effet notoire: Saccharose

INDICATIONS

- Anorexie primitive et secondaire suite à une maladie infectieuse, métabolique ou endocrinienne.
- Insuffisance pondérale.

CONTRE-INDICATIONS

- Sujet présentant une hypersensibilité à l'un des composants.
- Durant le traitement par IMAO
- Le glaucome
- Le syndrome de rétention urinaire
- Dans le cas d'occlusion intestinale.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

A utiliser avec prudence dans le traitement de cardiopathie, d'hypertension, d'hyperthyroïdie, d'asthme.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sucre : 2,50 g par cuillerée à café de sirop.
Comme pour tous les autres médicaments, ne pas laisser la préparation à la portée des enfants

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ne pas administrer le produit pendant la grossesse, pendant l'allaitement, dans les cas de prématurités, dans la période néonatale et dans la première enfance. Administrer seulement si cela est nécessaire et surtout sur avis du médecin.

VIGILANCE ET CONDUITE

Eviter les activités nécessitant vigilance et coordination telles que conduite d'automobiles ou utilisation de machines et d'engins mécaniques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Evitez la consommation d'alcool durant le traitement du fait de la présence de la cyproheptadine : cette association entraîne une dépression du système nerveux.

EFFETS INDESIRABLES

Avec l'usage de la cyproheptadine dans les doses notamment supérieures à celles administrées avec APETIL PLUS®, il a été signalé de rares cas de vertige, de sécheresse buccale, de céphalée, de nausée et vomissement, d'éruptions cutanées sur base allergique ou de photosensibilisation et exceptionnellement des symptômes de stimulation du SNC, d'hypertension, d'arythmies cardiaques, de dyscrasie hématologique.
Des cas de bouleversement ont été rapportés chez des patients, avec ou sans antécédent d'activité convulsive qui avaient reçu la lévocarnitine par voie orale ou intraveineuse.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Voie orale. Agiter le flacon avant utilisation.
Chez l'enfant, la dose journalière est de 0,750 g à 1 g de sirop par kg de poids corporel, répartie en 2 à 3 prises.

A partir de 6 ans, est suffisante une dose journalière de 0,5 g à 0,750 g par kg de poids corporel modifiable suivant l'avis du médecin.

Jusqu'à 10 kg	= 2,5 ml, soit ½ cuillère à café 2 – 3 fois / jour
De 10 à 15 kg (2 – 3 ans)	= 5 ml, soit 1 cuillère à café 2 – 3 fois / jour
De 15 à 20 kg (3 – 6 ans)	= 7,5 ml, soit 1 et ½ cuillère à café 2 – 3 fois / jour
Plus de 20 kg (7 ans et plus) Adulte	= 10 ml, soit 2 cuillères à café 2 – 3 fois / jour

FORME ET PRESENTATION
Sirop, flacon de 100 ml avec gobelet doseur.
CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver à une température inférieure à 30°C

Liste II

AMM n° E-2006-021

Laboratoires OLEA **25 BP 276 ABIDJAN 25**